

نیترا ت ها

آنژین قلبی زمانی رخ می دهد که عضله قلب خون کافی را دریافت نمی کند.

نیترا تها اثر ضد درد خود را از طریق کاهش نیاز عضله قلب به اکسیژن و همین طور از طریق خاصیت گشادکننده عروق و افزایش خونرسانی عضله قلب اعمال می کنند. همچنین برای درمان نارسایی قلب در ارتباط با حمله قلبی و فشارخون بالا حین عمل قلب باز استفاده می شوند.

انواع نیترا ت ها :

انواع نیترا تها شامل اسپری، قرصهای زیرزبانی (نیتروگلیسیرین) ، نیتروکانتین (سوستاک) ۲/۶ و ۶/۴ و ایزوسوربایدها می باشد. دوز و تعداد قرص مصرف روزانه با توجه به علائم شما و تشخیص پزشک تعیین می شود.

از جمله عوارض نیترا تها سردرد، سرگیجه، سبکی سر، تهوع و گرگرفتگی می باشد. زمانی که بدن شما با این دارو تطبیق یابد عوارض کاهش می یابد. اگر این عوارض باقی بماند یا بدتر شود با پزشک خود حتماً مشورت کنید. در صورتی که اخیراً آسیب مغزی، کم خونی و یا فشارخون پایین را تجربه کرده اید به پزشک خود اطلاع دهید. نیتروگلیسیرین نباید با داروهای درمان اختلال عملکرد نعوظ و فشارخون مانند سیلدنافیل بکار رود. زیرا تداخل این داروها حتی منجر به مرگ می شود. بنابراین باید حداقل ۴۸ ساعت بین زمان مصرف این داروها فاصله باشد (نیترا ت و سیلدنافیل نباید همزمان مصرف شوند) مصرف همزمان نیترا تها با ارگوتامین نیز مانع فعالیت های گشادکنندگی عروق شده و باعث آنژین صدری می شوند. داروهای جدیدتر ضدآنژین هم که امروزه در موارد مقاوم به درمان و طبق نظر پزشک متخصص مصرف می شوند عبارتند از رانولازین و نیکوراندیل.

نیکوراندیل برای درمان و پیشگیری آنژین تجویز می شود. این دارو اثراتی شبیه به نیترا تها دارد و با گشادکردن دیواره عروق شریان کرونر خونرسانی به قلب را بهتر می کند.

برای خواندن مطالب بیشتر کتاب مسیر سلامت قلب را از کتابراه دریافت کنید