

درمان برای ریتم های تند قلبی

بعضی از ریتم های تند قلب احتیاج به درمان دارند و برخی ندارند و می تواند شامل استفاده از دارو برای توقف آریتمی، پیشگیری از آریتمی و یا کنترل ضربان قلب در آریتمی باشد.

تحریک عصب واگ یک راه درمان در کنترل و توقف در تکیکاردی بطنی است که در این روش با تحریک عصب واگ که مسئول کاهش سرعت قلب به صورت نرمال است انجام می شود. این مانور به صورتی است که باید نفس عمیق بکشید و آن را به سمت پایین شکمتان مثل زمانی که یبوست دارید فشار دهید. مکیدن تکه ای از یخ یا شستشوی صورت با آب سرد می تواند به توقف تکیکاردی فوق بطنی (SVT) کمک کند.

راه دیگر درمان آریتمی ها، دستگاه ضربان ساز (دفیبریلاتور کاشتنی ICD) می باشد که بیشتر در افراد مبتلا به تکیکاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی استفاده می شود.

ریتم های تند قلب :

یکی از ریتم های تند قلبی فیبریلاسیون دهلیزی (AF) است که رایج ترین شکل از ریتم نامنظم قلب است. بطور میانگین در افراد بالای ۶۵ سال، از هر ۱۰۰ نفر ۴ نفر فیبریلاسیون دهلیزی دارند این افراد در بیشتر مواقع نبض نامنظم و تند دارند البته در مواردی نیز بیمار ممکن است فیبریلاسیون دهلیزی کند را تجربه کند.

برای خواندن مطالب بیشتر کتاب مسیر سلامت قلب را از کتابراه دریافت کنید.